

札幌の二重整形クリニック 料金・通院環境 分析レポート

独自調査8院ベース / 調査日：2026-09-11 / 分析日：2026-09-11 / 制作：mega-clinicメディア制作部

札幌で二重整形（埋没法・切開法）を受けられる8院の公開料金・立地・診察料を独自に調査し、料金相場を目安と札幌ならではの通院環境を分析しました。数値は各院公式サイト記載時点（2026-09-11）のもので、最新は各院でご確認ください。

1. 料金相場の目安（治療法別・税込）

治療の種類	相場の目安	札幌での補足
埋没法（スタンダード・2点前後）	22,000円～120,000円	全国チェーン（品川・SBC）は2～5万円台と安く、地域密着院（札幌中央形成外科）は10万円台に上振れ
埋没法（多点・自然癒着系/上位ライン）	108,900円～548,000円	3～6点留めや自然癒着法、TCBの生涯保証付き上位プランで高額化する傾向
切開法（全切開・オプション込み）	132,000円～440,000円	目頭切開やROOF除去などの併用オプションで上振れしやすい

2. エリア分布（8院）

札幌駅・さっぽろ駅エリア

4院

TCB東京中央美容外科（札幌駅前院）／品川美容外科（札幌院）／湘南美容クリニック（SBC札幌院）／聖心美容クリニック（札幌院）

大通駅エリア

4院

東京美容外科（札幌院）／札幌中央形成外科／札幌ル・トロワ ビューティークリニックVogue／札幌中央クリニック

8院がJR札幌駅・さっぽろ駅エリアと大通駅エリアにちょうど4院ずつ分かれて立地しています。なかでも湘南美容クリニック（SBC札幌院・13F）と聖心美容クリニック（札幌院・15F）は同じ「JRタワーオフィスプラザさっぽろ」ビルに入居しており、1棟で複数院を比較できる立地です。

3. 札幌ならではの通院環境

- 積雪期でも歩きやすい駅直結・地下導線**：JR札幌駅・さっぽろ駅・大通駅は地下鉄南北線・東豊線と地下歩行空間「チカホ」で結ばれており、SBC札幌院と聖心美容クリニックが入居する「JRタワーオフィスプラザさっぽろ」のように、積雪期でも屋外をほぼ歩かずに通院できるビルが複数あります。
- 大通エリアのオフィスビル集積**：大通駅周辺の4院（東京美容外科・札幌中央形成外科・Vogue・札幌中央クリニック）はいずれも地下鉄出口直結・徒歩10分以内のオフィスビル内にあり、地下街オーロラタウンなどを経由して仕事帰りにも立ち寄りやすい立地です。
- 全国チェーンと地域密着院の共存**：TCB・品川・SBCなど全国共通料金のチェーン院と、札幌ル・トロワVogueや札幌中央形成外科のような地域密着型クリニックが徒歩圏内に共存しており、全国標準メニューと聖心美容クリニックの「切らない眼瞼下垂+α法（札幌院独自メニュー）」のような地域院オリジナルメニューを比較検討しやすい環境です。

4. 診察料・保証制度の傾向

診察料

無料・非公開・有料が混在

保証・モニター制度

全国チェーンにモニター価格あり

TCB・SBCの2院は初診料・再診料・カウンセリング料をすべて無料と明記しています。一方、札幌ル・トロワVogueは初診3,300円・再診1,100円（前田院長のみ5,500円）、札幌中央形成外科は再診料500～1,000円と有料です。品川・東京美容外科・聖心・札幌中央クリニックの4院は無料カウンセリングの案内にとどまり、初診料・再診料の具体的な金額は非公開です。

SBCは週末二重（2点留め）で通常49,800円に対しモニター29,800円を案内し、TCBは1dayクイックアイに生涯保証付きの上位プラン（プレミアムエタニティ等）を用意しています。札幌ル・トロワVogueもモニター価格をLINE問い合わせ限定で案内しています。

5. 分析から見える選び方の示唆

- 全国チェーン（TCB・品川・SBC）はスタンダードな2点留めなら2～5万円台からと手が届きやすい一方、点数や上位ラインを選ぶと十万円台後半～50万円台まで一気に上がるため、希望の点数・保証年数を先に決めてから比較しましょう。
- 診察料は「無料」「非公開」「有料」の3パターンが混在するため、来院前に電話やLINEで確認すると安心です。
- 切開法・自然癒着法などデザイン性の高い施術ほど、表示価格に修正保証やオプション（脂肪除去・ROOF除去等）が含まれるか事前に確認しましょう。二重整形は自由診療のため、効果には個人差があります。

※本レポートはmega-clinicメディア制作部が各院公式サイト の公開情報をもとに独自に集計・分析したものです。料金・所在地は調査時点（2026-09-11）の情報で、変更される場合があります。最新情報は各院公式サイトでご確認ください。二重整形は自由診療であり、効果には個人差があります。腫れ・内出血・左右非対称・糸の露出などのリスクや副作用が生じる場合があります。